

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Ирбейская районная больница
с. Ирбейское, 663650
Интернациональная ул., д.142,
Телефон: (39174) 31-1-65
Факс: (39174) 31-1-65
E-mail: irb_crb@krasmail.ru
ОКПО 01913576
ИНН/КПП 2416002065/241601001
от « 13 » 03 2024 г.

Руководителю управления
образования Ирбейского района
Черниковой Н.И.

Информация по вакцинации
против вирусного клещевого энцефалита

КГБУЗ "Ирбейская РБ" направляет Вам информацию по вакцинации против
вирусного клещевого энцефалита. Просим ознакомить родителей учащихся.

Приложение 1 стр

Главный врач



Карпов К.К.

Районный педиатр
Марченко Софья Андреевна
+79232988179

Вакцинация против клещевого энцефалита.

Клещевой вирусный энцефалит - вирусная природно-очаговая инфекция, передающаяся клещами, протекающая с лихорадкой, интоксикацией, поражением центральной нервной системы, принимающая иногда хроническое течение и нередко приводящая к летальному исходу.

Из 61 административных территорий Красноярского края- 57 являются эндемичными по Вирусному клещевому энцефалиту, в том числе Ирбейский район. Всего в Красноярском крае в 2023 году 14 558 человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей, из них 2968 детей. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был установлен 284 жителям края. Кроме того, клещевым боррелиозом заболели 228 человек, сибирским клещевым тифом — 10, анаплазмозом — 3, эрлихиозом — 2.

Чаще всего встречи с клещами происходили при выходе в лес, выездах на природу и на дачу. Также случаи присасывания фиксировались в населенных пунктах, в том числе Красноярске.

Единственным и эффективным методом профилактики заболевания является прививка против клещевого энцефалита.

Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить осенью, зимой или ранней весной до начала активности клещей.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по 2 схемам - основной или экстренной.

Основная схема вакцинации включает 2 прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 7 мес. Затем через 5-12 мес. (в зависимости от вакцины) необходимо поставить 3 прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки – это законченный курс вакцинации. Далее следуют отдаленные ревакцинации – прививка 1 раз в 3 года.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между 1 и 2 прививкой (от 2 недель до 1 мес. в зависимости от вакцины) и проводится, как правило, перед сезоном в зимне-весенний период. Ревакцинация проводится через 1 год после 2 прививки, в последующем – каждые 3 года.

Посещать лесной массив можно не ранее чем через 2 недели после второй прививки.

Доказано, что вакцинация в 89% случаев предотвращает заражение. В оставшихся случаях пациенты все-таки заболевают, но болезнь проходит в легкой форме, не вызывая осложнений.

В нашем учреждении есть вакцина Клещ-Э-Вак для специфической профилактики клещевого энцефалита у детей с 1 года.

Прививки от клещевого энцефалита детскому населению проводятся из средств регионального бюджета, в связи с чем мы рекомендуем воспользоваться своим правом и провести бесплатную вакцинацию ваших детей.

Болезнь легче предупредить, чем лечить!

Администрация КГБУЗ «Ирбейская РБ»